

## 1.1. Concetto per il trattamento della varroa

Mese	Misure	Gruppo prontuario	
Febbraio			
Marzo	Inserire telaino per la covata da fuco e rimuovere più volte quella opercolata	Arginare la proliferazione della varroa	
Aprile	Creazione di giovani colonie/nuclei		
Maggio			
Maggio	Contare la caduta naturale della varroa Se più di 3 acari al giorno → trattamento d'urgenza	Diagnostica della varroa/Trattamento d'urgenza	
Giugno	Rimozione favo da fuco/Creazione di giovani colonie/nuclei	Arginare la proliferazione della varroa	
Luglio	Contare la caduta naturale della varroa Se più di 10 acari al giorno → Trattamento d'urgenza o trattamento estivo immediato (con o senza acido formico)	Diagnostica della varroa/Trattamento d'urgenza o estivo	
	1° trattamento estivo a scelta <u>senza o con</u> acido formico	Iniziare 1° metà di luglio Senza acido formico (Blocco della covata, Metodo del telaino trappola o Asportazione totale della covata)	Altri metodi di trattamento
		o Iniziare entro la fine di luglio Con acido formico	Trattamento estivo
Agosto			
Settembre	2° trattamento estivo	Iniziare al più tardi a metà sett. Sempre con acido formico	Trattamento estivo
Ottobre			
Novembre	Contare la caduta naturale della varroa Se più di 5 acari al giorno → trattamento immediato con acido ossalico	Diagnostica della varroa	
Dicembre	Trattamento con acido ossalico <u>in assenza di covata</u>	Trattamento invernale	
Gennaio	Contare la caduta dovuta al trattamento Se durante le 2 settimane dopo il trattamento invernale più di 500 acari sul fondo → ripetere trattamento invernale (nebulizzazione o evaporazione)	Diagnostica della varroa/Trattamento invernale	

Arginare la proliferazione della varroa

Valutare l'infestazione della varroa

Trattare